

23/06/2017

Il Protocollo Viticolo edizione 2017 è disponibile presso gli uffici del Consorzio di Tutela. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è **attivo lo Sportello Viticolo con il cell 389 5220220 e la mail gruppotecnico@prosecco.it al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.**

METEO

La fase di alta pressione che ha portato in questi giorni le temperature sopra la media del periodo durerà fino a domani sabato 24 giugno, per poi lasciar spazio a un tempo instabile nella giornata di domenica 25 giugno, dove avremo precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale. Lunedì 26 tempo stabile e soleggiato, mentre per la giornata di martedì sono previsti addensamenti nuvolosi con probabili precipitazioni che potrebbero protrarsi nei giorni successivi.

Per ogni dettaglio, è possibile consultare il link http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php quale fonte dati dei nostri comunicati.

Per accedere alla consultazione delle centraline distribuite all'interno della Denominazione, è possibile inserire il seguente indirizzo sul browser **88.149.188.186/docg/mappa.html**.

Si ricorda che il nome utente è "docg", mentre la password "d4cg".

OSSERVAZIONI IN CAMPO

Fenologia - situazione al 19.06.2017

LOCALITÀ	FENOLOGIA GRAPPOLO
Carpesica	bacche delle dimensioni di un pisello
Cartizze	bacche delle dimensioni di un pisello
Col San Martino	bacche delle dimensioni di un pisello
Colbertaldo	bacche delle dimensioni di un pisello
Colfosco	bacche delle dimensioni di un pisello
Collalto	bacche delle dimensioni di un pisello
Colle Umberto	bacche delle dimensioni di un pisello
Combai	bacche delle dimensioni di un pisello
Conegliano	bacche delle dimensioni di un pisello
Premaor	bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello
Refrontolo	bacche delle dimensioni di un pisello
Rolle Medio	bacche delle dimensioni di un pisello
S. Maria di Feletto	bacche delle dimensioni di un pisello
Soligo	bacche delle dimensioni di un pisello
Valdobbiadene	bacche delle dimensioni di un pisello

Tab. 1 – Rilievo fenologico effettuato nei vigneti testimone il lunedì 19 giugno 2017.



**PROTOCOLLO
VITICOLO** DEL
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG

BOLLETTINO AGRONOMICO

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

Peronospora – Plasmopara viticola

I sistemi previsionali indicano una copertura assicurata fino al termine della settimana anche a fronte delle precipitazioni previste per domenica 25. Pertanto, si consiglia di intervenire tra lunedì 26 e mercoledì 28 o comunque prima di ulteriori precipitazioni, con i seguenti principi attivi:

Ametoctradin + dimetomorph

o

Mandipropamide + Zoxamide

o

Zoxamide + rame

(attenzione al numero di CAA, come dimetomorph, mandipropamide, già impiegati)

il tutto alle dosi per ha indicate in etichetta.

NB: Per chi avesse riscontrato infezioni di peronospora nel proprio vigneto si consiglia di contattare il gruppo tecnico al numero **389 5220220**, al fine di stabilire una strategia di difesa mirata al contenimento dell'infezione in corso.

Oidio – Erysiphe necator

I modelli previsionali indicano un'elevata pressione infettiva favorita dalle condizioni metereologiche; si consiglia di ripristinare la protezione negli stessi tempi indicati per la peronospora con:

Zolfo bagnabile alla dose di 5 kg/ha

+

Quinoxifen o Cyflufenamid (in alternanza al precedente trattamento), alla dose per ha indicata in etichetta.

NB: per coloro i quali avessero impiegato una delle due molecole soprariportate, porre attenzione all'intervallo tra i trattamenti indicato in etichetta, ed eventualmente alternare i due principi attivi.

Biologici:

Si consiglia di ripristinare la copertura nei tempi sopra indicati attraverso l'utilizzo di:

Poltiglia bordolese a metà della dose minima di etichetta

+

idrossido di rame a metà della dose minima di etichetta

+

Zolfo bagnabile alla dose di 5 kg/ha.



GESTIONE IN VERDE

Dato lo stadio fenologico raggiunto sia dalla vegetazione che dal grappolo è opportuno iniziare le operazioni di sfemminellatura in fascia grappoli per ridurre gli eventuali affastellamenti, consentire un'adeguata areazione e la corretta ed uniforme bagnatura.

INSETTI

I rilievi eseguiti in campo evidenziano l'inizio dei voli di tignola in tutte le località. In tabella viene riportato l'inizio del volo e il posizionamento dell'intervento insetticida specifico, con vari principi attivi tra i quali il viticoltore potrà scegliere il preferito.

Località	Data inizio voli	Bacillus thuringensis (uso biologico)	Piretro (uso biologico)	Indoxacarb, emamectina benzoato	Clorantraniliprole	Metossifenoziide	Fosfororganici (Clorpirifos etile e metile)
Cartize	9 giugno	16 giugno	27/29 giugno	17/19 giugno	19/21 giugno	14/16 giugno	27/29 giugno
Colfosco	9 giugno	16 giugno	27/29 giugno	17/19 giugno	19/21 giugno	14/16 giugno	27/29 giugno
Carpesica	12 giugno	19 giugno	30 giugno/2 luglio	20/22 giugno	22/24 giugno	17/19 giugno	30 giugno/2 Luglio
Soligo	12 giugno	19 giugno	30 giugno/2 luglio	20/22 giugno	22/24 giugno	17/19 giugno	30 giugno/2 Luglio
Collalto	19 giugno	26 giugno	7/9 luglio	27/29 giugno	29 giugno/1 luglio	24/26 giugno	7/9 luglio
Conegliano	19 giugno	27 giugno	7/9 luglio	27/29 giugno	30 giugno/1 luglio	24/26 giugno	7/9 luglio
Rolle medio	22 giugno	30 giugno	10/12 luglio	30 giugno/2 luglio	3/5 luglio	27/29 giugno	10/12 luglio

Inoltre, qualsiasi trattamento insetticida va eseguito solo ed esclusivamente dopo l'avvenuto sfalcio dell'erba associato a qualsiasi altro accorgimento volto a salvaguardare l'entomofauna utile.