



SCUOLA
ESPERIENZIALE
ITINERANTE
DI
AGRICOLTURA
BIOLOGICA.



Cimici dei cavoli (insetti)



***Eurydema ventrale* (giallo)**



Eurydema ventrale (rosso)

Non confondiamo la Cimice del cavolo col Pirrocoride!



SCUOLA
ESPERIENZIALE
ITINERANTE
DI
AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Pirrochoris apterus



Eurydema ventrale
(cimice del cavolo)



Pyrrhocoris apterus
(pirrocoride)



SCUOLA
ESPERIENZIALE
ITINERANTE
DI
AGRICOLTURA
BIOLOGICA




***Eurydema oleraceum* (giallo)**



***Eurydema oleraceum* (rosso)**



sono anche lo stadio svernante



uova (mm 1)



giovani 2a età



**apparato boccale
pungente-succhiante**



apparato boccale
pungente-succhiante







**Si controlla con
piretro contro giovani
e adulti**

Piretro naturale

- dai fiori di *Chrysanthemum cinerariaefolium*
- agisce per contatto
- foto-labile e termo-labile
- trattare al tramonto
- pH < 7, non mescolare al rame



- uccide giovani ed adulti
- non è selettivo (se colpiti, uccide anche gli insetti non bersaglio)
- non penetra nella vegetazione
- la sua azione insetticida è immediata
- è tossico per le api e i pesci
- intervallo di sicurezza per la maggior parte degli ortaggi: 2 giorni

