



**Mosca del porro**  
***Napomyza gymnostoma* (insetto)**

**adulti**

inattivi  
d'estate

**pupa**

**uova**

**vari stadi  
giovanili**

sono la forma  
svernante

è la forma  
svernante




**1 generazione/anno**






**attacca anche cipolla, aglio e scalogno**



**SCUOLA  
ESPERIENZIALE  
ITINERANTE  
DI  
AGRICOLTURA  
BIOLOGICA**




**adulto (mm 5)**



**SCUOLA  
ESPERIENZIALE  
ITINERANTE  
DI  
AGRICOLTURA  
BIOLOGICA**






**SCUOLA  
ESPERIENZIALE  
ITINERANTE  
DI  
AGRICOLTURA  
BIOLOGICA**



**punture di suzione**



**SCUOLA  
ESPERIENZIALE  
ITINERANTE  
DI  
AGRICOLTURA  
BIOLOGICA**




**SCUOLA  
ESPERIENZIALE  
ITINERANTE  
DI  
AGRICOLTURA  
BIOLOGICA**



**mina (galleria) su foglia**






SCUOLA  
ESPERIENZIALE  
ITINERANTE  
DI  
AGRICOLTURA  
BIOLOGICA




pupa (mm 5)



**SCUOLA  
ESPERIENZIALE  
ITINERANTE  
DI  
AGRICOLTURA  
BIOLOGICA**




**pupa (mm 5)**



SCUOLA  
ESPERIENZIALE  
ITINERANTE  
DI  
AGRICOLTURA  
BIOLOGICA



pupa (mm 5)



**SCUOLA  
ESPERIENZIALE  
ITINERANTE  
DI  
AGRICOLTURA  
BIOLOGICA**



**pupa (mm 5)**



**piretro > adulti**  
**azadiractina > larve**  
**spinosad > larve e adulti**








**oppure copertura con tessuto-non-tessuto dal 15 settembre  
fino all'arrivo del (vero) freddo**





**SCUOLA  
ESPERIENZIALE  
ITINERANTE  
DI  
AGRICOLTURA  
BIOLOGICA**



**tessuto non tessuto**






**SCUOLA  
ESPERIENZIALE  
ITINERANTE  
DI  
AGRICOLTURA  
BIOLOGICA**







**SCUOLA  
ESPERIENZIALE  
ITINERANTE  
DI  
AGRICOLTURA  
BIOLOGICA**