



AGRINOTIZIE CODITV

CO.DI.TV. Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)

Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: coditv@coditv.it

Bollettino n. 08/12

Inviato il 1/06/12

VITE: FIORITURA MOLTO DIFFORME e PROIEZIONE DI INIZIO VENDEMMIA A FINE AGOSTO...PERO' GRANDE ATTENZIONE ALLA PERONOSPORA!

L'andamento meteorologico di maggio si è confermato con grande variabilità termica e precipitativa (con grandinate a macchia di leopardo) che hanno causato, insieme all'andamento piovoso di aprile (19 giorni!), condizioni di grande virulenza del fungo della Peronospora, come si sta evidenziando in gran parte del nostro ambiente viticolo; infezioni del 5-6 maggio: fine incubazione 12 maggio; infezioni 13 e 16 maggio: fine incubazione 23 e 26 maggio; infezioni 21 e 22 maggio: fine incubazione 27 e 28 maggio...

Tutte queste infezioni sono state puntualmente riscontrate sia su foglia (primarie, secondarie ed anche a mosaico!) che sui grappoli, confermando la pericolosità del fungo peronosporico di quest'anno.

Dal lato fenologico le varie cultivar viticole stanno evidenziando in questi giorni, anche se in maniera difforme, la **FIORITURA** proiettando, come da titolo, l'ipotetico inizio della vendemmia del Pinot grigio (prima maturazione varietale) verso la fine del mese di agosto.

A questo punto, la **difesa antiperonosporica** può proporre diverse soluzioni (dopo l'ultimo trattamento indicato con sistemici il 25 di maggio): intervenire attorno alla giornata di **martedì 5 giugno** con il secondo **endoterapico sistemico** con sostanze attive a base di **Metalaxil, Metalaxil-M, Benalaxil, Benalaxil-M, Fosetil di alluminio**...oppure, anticipando di 2-3 giorni (attorno al 2 giugno) con **endoterapici citotropici translaminari** a base di **Fluopicolide, Mandipropamide, Valifenalate, Dimetomorf, Iprovalicarb, Bentiavalicarb, Ciazofamide, Fenamidone.. Cymoxanil**. Contro l' **Oidio** (fase molto recettiva quella fiorale, quindi non dimezzare le dosi!), abbinare agli antiperonosporici endoterapici, **antioidici** con pari durata di protezione (superiore agli 8 giorni), tipo **Triazoli** o **I.B.S., Metrafenone, Spiroxamina, Bupirimate...**

Per le aziende che continuano ad operare con linee di difesa antiperonosporica di **Superficie** (**Mancozeb, Metiram, Propineb, Folpet, Ditianon, Rameici**), rimangono le attenzioni e gli accorgimenti più volte riportati: calendario di copertura attorno ai 6-7 giorni e **ripristino** immediato dell'intervento in caso di piovosità che possa causare il dilavamento del prodotto.

In questo caso la difesa antioidica potrà avvalersi dell'impiego dello **Zolfo micronizzato**.

Il CO.DI.TV. ricorda a chi volesse inviare un aiuto ai TERREMOTATI dell'EMILIA, la possibilità di donare 2 euro tramite cellulare con sms o chiamando dal fisso al n. 45500