



AGRINOTIZIE CODITV

CO.DI.TV. Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità
Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)
Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: coditv@coditv.it

Bollettino n. 9/12

del 13 giugno 2012

VITE: DIFFORMITA' FENOLOGICA E PERICOLI FUNGINI...NULLA CAMBIA!

Nulla è cambiato, purtroppo, in questa prima decade del mese di giugno. L'andamento meteorologico è rimasto infatti caratterizzato da una forte variabilità, con piovoschi, umidità elevate e momenti soleggiati che hanno accentuato ancor di più un habitat idoneo per lo sviluppo sia della Peronospora (rischio di...Boletus viticola o "Porcino della vite"..scherzo!), che dell'Oidio.

In questa fase centrale del ciclo vegetativo si evidenziano maggiormente i diversi stadi fenologici (dalla fioritura alla prechiusura del grappolo!!) all'interno dello stesso vigneto e addirittura nella stessa vite, presagendo quindi una futura maturazione dell'uva alquanto complessa ed eterogenea.

Il sesto trattamento **antiperonosporico** potrà essere posizionato attorno alla giornata di **sabato 16 giugno** con prodotti endoterapici **Sistemici** (terzo intervento) tipo **Metalaxil, Metalaxil-M, Benalaxil, Benalaxil-M, Fosetil di alluminio**...oppure, anticipando l'intervento per coloro che proseguono nella linea **Citotropica Translaminare** e/o **Mesostemica**, o iniziando ad utilizzare i prodotti che si "legano alle cere" (degli acini, quindi da grano di pepe), con sostanze attive tipo: **Zoxamide, Amisulbrom, Ametoctradin**.

In questo periodo bisogna elevare l'attenzione anche nei confronti dell'**Oidio**. Agli antiperonosporici endoterapici che si impiegano con intervalli superiori agli 8 giorni, utilizzare **antioidici** tipo **Triazoli** o **I.B.S., Metrafenone, Spiroxamina, Bupirimate, Quinoxifen**...

Attenzione alla fase fenologica che si presenta già in alcuni casi a "**grano di pepe**" nelle cultivar precoci (Pinot, Chardonnay..), per intervenire opportunamente con un **antibotritico** specifico quando si arriverà alla successiva fase di **prechiusura del grappolo**.

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE 2 0 1 2

La **Regione Veneto** con proprio **Decreto n. 22 del 7 giugno 2012** applica anche quest'anno le "**Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite**". Tale **obbligo** comporta **1 trattamento insetticida** contro la cicalina **Scaphoideus titanus** vettore della malattia per tutti i viticoltori dell'intera **provincia di Treviso**, dell'intera area della **DOC Lison-Pramaggiore** in provincia di Venezia e dell'area **DOC Breganze** in provincia di Vicenza. Nel rimanente territorio viticolo della regione Veneto, il trattamento insetticida sarà obbligatorio, ma solo al **riscontro** nel vigneto della cicalina *Scaphoideus titanus*.

LOTTA OBBLIGATORIA alla FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE
DGR del Veneto n. 22 del 7 giugno 2012

Trattamenti insetticidi indicati nella lotta alla cicalina *Scaphoideus titanus*:

- 1) **FLUFENOXURON**; IGR (insetticida regolatore di crescita) attivo sulle **Cicaline** che infestano la vite (scafoide, verde e gialla), ma anche contro le **Tignole** dell'uva e gli **Acari fitofagi**; da irrorare tra **sabato 16** e **sabato 23 giugno**, agisce sulla muta degli insetti.
BUPROFEZIN; IGR attivo contro le **Cicaline** che infestano la vite (anche **Cocciniglie**), non ammesso sulle Tignole dell'uva. Trattare con il Buprofezin tra il **16** e il **23 giugno**.
- 2) **INDOXACARB**; (ovi-larvicida, NO regolatore di crescita). Agisce sia sullo *Scaphoideus* che sulle Tignole.
THIAMETHOXAM; specifico contro le **Cicaline** (ammesso nella lotta alle Tignole solo se in miscela con **Clorantraniliprole**); Da applicare tra **venerdì 22** e **venerdì 29 giugno**.
- 3) **CLORPIRIFOS ETILE**; Fosfororganico attivo contro le **Cicaline** e le **Tignole** della vite.
ETOFENPROX; con spiccata attività contro le **Cicaline**. **CLORPIRIFOS METILE**; ammesso contro le **Tignole**, ma talvolta anche contro le **Cicaline** (comunque fare sempre **attenzione a tutto ciò che viene riportato sull'etichetta degli agrofarmaci da utilizzare!**).
La data per l'applicazione di tali prodotti sarà comunicata nei prossimi bollettini.

Nella strategia di lotta contro i vari fitofagi (Cicaline, Scafoideo, Tignole, Cocciniglie, Acari), si potrà **scegliere** uno dei punti descritti (1, 2, 3) ed intervenire, eventualmente in seconda battuta contro lo *Scaphoideus titanus*, in concomitanza della lotta alle Tignole di 2a generazione, impiegando in questo caso solo prodotti neurotossici.

Per i viticoltori aderenti ai programmi di **"agricoltura biologica"** Reg. CE 834/2007, si indicano **due trattamenti insetticidi da effettuarsi a distanza di 7 – 10 giorni**, date le caratteristiche di scarsa persistenza e foto/termolabilità dei prodotti ammessi per la difesa in agricoltura biologica: **PIRETRO NATURALE** con **Piperonil butossido** (quest'ultimo non ammesso ancora nelle uve destinate alla vinificazione dei vini esportati negli Stati Uniti d'America).
Le date idonee per tale intervento verranno comunicate nei prossimi bollettini.

Intervenire con gli insetticidi verso sera, bagnando bene tutta la pianta, irrorando inizialmente i filari esterni del vigneto (perimetro).

Si ricorda infine di trattare tutti i vigneti soprattutto i giovani impianti ed anche quelli abbandonati o trascurati (responsabilità dei proprietari e/o conduttori), applicando tutti gli accorgimenti necessari (sfalcio dell'erba, ecc.), per la salvaguardia dell'entomofauna utile, tra cui le api (L.R. n. 23 del 18/04/1994, art. 9, comma 4)!

L'inosservanza delle prescrizioni di lotta obbligatoria del DGR del Veneto n. 22 del 7 giugno 2012 sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Fiorello Terzariol

Si ringrazia per la collaborazione il Servizio Fitosanitario Regione Veneto.